



Farmacia: Mónica Enríquez Paraled
Lda. 11864
Cl. Pque Eugenia de Montijo, 80
28047 – Madrid
Tel: 640932417/914620070
M-1616-F

"Fórmula Magistral
Individualizada"

Fmla: Carvedilol 0.5mg/ml
Suspensión acuosa.

Forma Farmacéutica: Suspensión
acuosa no estéril.

Vía de Administración: Vía oral.

Composición (por 100ml) :

Carvedilol..... 0.05g
Excipiente:
Syrspend SF Ph4(*)*csp 100ml

(Syrspend SF4=
Agua purificada, almidón modificado, ,
sucralosa, sodio benzoato (<0,1 %), ácido cítrico,
simeticona, sodio citrato, ácido málico.)

Indicaciones:
Insuficiencia cardiaca.

Posología: Según lo indicado en la receta.

**Normas para la correcta
administración:**

Agitar antes de usar. Saque el frasco de la nevera, agite ligeramente y tome la dosis prescrita con la jeringa que proporcionamos, cierre el frasco y vuélvalo a guardar en la nevera. Una vez administrada la dosis, enjuague bien la jeringa con agua (desmontándola), déjela secar y vuelva a guardar (en la bolsa que acompaña a la fórmula magistral para evitar que se ensucie)

Se recomienda administrar con alimentos o sin ellos. Aunque la toma con alimentos, disminuye la posibilidad de presentar mareos al levantarse. Procure siempre tomarlo a la misma hora.
Conservación: Conservar a temperatura entre 5 y 10°C (en nevera) y protegido de la luz y humedad directa.

Efectos Adversos:

Los más frecuentes son, dolor de cabeza, mareos, cansancio, fatiga, náuseas y diarrea. Si estas reacciones se vuelven severas consulte al médico. Avise al médico en caso de sufrir dificultad para respirar, síntomas de alergia y sangrados.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que falten **menos de 6 horas** para la siguiente toma; entonces no la tome y espere a la siguiente toma. No duplique la dosis para compensar un olvido

Caducidad: No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicada en el envase. **90 días.**

ADVERTENCIAS:

- * **Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.**
- * **Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de niños.**
- * **Desechar el envase al SIGRE una vez terminado el tratamiento.**

**RECUERDE QUE SI NECESITA
CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO
CUANDO TERMINE ESTA FÓRMULA
MAGISTRAL DEBE ACUDIR A SU MEDICO
PARA QUE LE FACILITE UNA NUEVA
RECETA. AUNQUE SE TRATE DE
REPETICIÓN DE LA MISMA FÓRMULA
(NO SON VÁLIDAS PRESCRIPCIONES
FOTOCOPIADAS O ESCANEADAS).**

Precauciones y Reacciones Adversas:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica al tfno: 915620420

Nº RPP de envases: ENV/2025/000061837